

Noteringen

Svinenoteringen er uændret.

	Danish Crown	TiCan
Slagtesvin	8,60	8,30
Søer	6,50	6,00
Orner	5,50	5,00

En 7 kg SPF gris koster 200 kr., og en 30 kg gris koster 328 kr. i beregnet notering. En økologisk smågris på 30 kg koster 719 kr. Puljenotering for konventionelle grise ved SPF-selskabet og Nordjysk Smågrisesalg er i den kommende uge 370 kr. Er grisene fri for PRRS og har kendt sundhedsstatus, er puljeprisen 390 kr. Porcex byder 405 kr. for de bedste smågrise ved 30 kg.

Dækningsbidrag for smågrise inkl. sohold er 118 kr./gris og for slagtesvinene kan det beregnes til 89 kr./gris

Eksport af levende svin

	2008	2009
Smågrise 0-15 kg	337.000	401.000
Smågrise 15-50 kg	4,9 mio.	6,6 mio.
Slagtesvin	860.000	1,1 mio.
Søer	200.000	143.000

Dieadfærd

Pattegrise opstaldet i stier til løsgående diegivende søer har højere fravænningsvægt end pattegrise opstaldet i traditionelle kassestier. Det tyder på højere mælkeoptagelse, når søerne går løse i farestalden.

Hvis farebøjlen er åbnet op foregår diegivningen mere roligt med færre pattekampe samt færre grise, der ikke får mælk under en diegivning.

Gode adgangsforhold og god plads ved yveret har indflydelse på adfærden under diegivning.

Turbo på slagtesvin

I samarbejde med den lokale svine-rådgivning og VSP gennemføres i 2010/2011 en intensiv rådgivning og opfølgning i 40 slagtesvinebesætninger i Danmark.

Ved månedlige rådgivningsbesøg, vil håndværket i stalden blive vist og drøftet, og der vil blive lagt megen energi i opfølgning. Producenten skal have lysten og viljen til at investere energi og penge i forbedrede resultater. Man skal have styr på det produktionstekniske anlæg, og den økonomiske effekt af rådgivningen skal kunne måles.

Der er projektmidler støttet af EU til rådighed, og rådgivningen kan derfor udføres til ca. halv pris. Det maksimale støttebeløb pr. bedrift er 25.000 kr. For at nå dette beløb skal man altså selv investere tilsvarende. Interesserede slagtesvineproducenter opfordres til at henvende sig til LandboNord.

Ketose

Ketose er en stofskiftelidelse, der kan opstå, når søerne bruger mere energi end de optager, f.eks. i forbindelse med en høj mælkeproduktion. Lidelsen er kendt blandt højtydende malkekøer først i laktationen, og symptomerne er ædevægring, nedsat mælkeproduktion, væggtab og slingrende gang. Årsagen er en negativ energibalance. Nu undersøges forholdene ved søerne. Test for Ketose udføres ved at malke et par dråber ned på en papirstik og her ses en farveændring, hvis der er problemer.

Det fandtes i 5 af 19 undersøgte besætninger. Målet er at finde de søer der måske vil gå fra foderet i farestalden og gå ned i mælkeproduktion og måske drille ved en efterfølgende brunst. VSP fortsætter en besætningsafprøvning i 10 besætninger.

Arbejdstilsynet

Flere landmænd kan berette om uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet. De forskellige tilsynsførende har hver sit interesseområde, og nogle går op i, om der er farlige maskiner og synlige ulykkesfarer, og andre går mere op i, om der er sikkerhedsdatablade og brugsanvisninger tilgængelig.

Der skal være en ArbejdsPladsVurdering udarbejdet sammen med de ansatte, og man skal dokumentere årligt eftersyn af sine maskiner. Er du i tvivl om noget af alt dette hjælper vi dig gerne med at få tingene bragt i orden, hellere før de uanmeldte besøg end efter.

Korrekt aflivning

En korrekt aflivning indebærer bedøvelse med boltpistol efterfulgt af afblødning. Afblødning er en meget væsentlig del af aflivningen, og grisene er først aflivet, når den også er afblødt. Alle besætninger skal have en fast procedure for aflivning, og der skal være klare aftaler om, hvem der tager beslutningen, og hvem der er ansvarlig for, at det bliver udført rigtigt. Myndighederne har i de kommende måneder fokus på emnet bl.a. i forbindelse med DAKAs afhentninger.

En korrekt aflivning af smågrise over 5 kg, ungsvin, slagtesvin, søer og orner udføres ved først at bedøve dyret med boltpistol og derefter aflive dyret ved at overskære mindst den ene af de to halspulsårer. Da der er mange, som oplever især afblødningen som et ubehageligt arbejde, er det vigtigt at få den rigtige instruktion og rutine med dette arbejde.

Hvis der er usikkerhed om den praktiske procedure, anbefales det, at medarbejder og dyrlæge gennemfører aflivninger sammen i forbindelse med et af dyrlægens faste besøg.

Posegrise

Forekomsten af pung- og navlebrok er formentlig delvist arveligt betinget, men arveligheden kendes ikke. I nogle besætninger optræder det med op til 2 % af fravænnede grise, og den ene procent bør man allerede aflive straks, da sandsynligheden for at de senere kan leveres til slagteriet er nul. Landmænd har oplevet, at i løbet af opdrætsperioden blev yderligere halvdelen af den anden procent også aflivet, fordi slagteriet ikke ville modtage grise med store brokposer.

Kilde: Danavl

Ødemsyge

I 1994 blev Ødemsyge første gang konstateret i Danmark. Der er mange pludselige dødsfald blandt fravænnede grise, og grise der uden symptomer om morgenen kan være døde til middag.

Der opstår en væskeansamling over øjnene, i bugvæggen, i mavesækken og i hjernen. En væskeophobning i hjernen fører til akut dødsfald. Sygdommen udlæses af en colibakterie. Det er ikke muligt at deklarere en svinebesætning fri for Ødemsyge, men hvis diagnosen er stillet, er den også sikker.

Hvis en avlsbesætning har fået betinget status for Ødemsyge, må alvdyrene ikke sælges i Danmark med mindre, køberne skriftligt har accepteret dette. Ødemsyge skal søges forbygget på samme måde som fravænningsdiarre og især restriktiv fodring efter fravæning er vigtig. Man kan også sprøjte grisene med serum ved fravæning. Efter 1-2 måneder kan man forsøgsvis prøve at undgå det igen.

Kilde: Danavl og sygdomsbog svin

Aktiviteter

Er 35 grise pr. årssø realistisk?

Onsdag den 14. april 2010

Kl. 09.30-15.30 på LandboNord

Tilmeldingsfrist 7. april.