

### Noteringen

Noteringen for slagtesvin er uændret. Søer og orner stiger med 20 øre pr. kg.

Danish Crown og Tican			
<b>Slagtesvin</b>			10,10
<b>Søer</b>			6,90
<b>Orner</b>			5,90
<b>Polte</b>			7,30
40-49,9 kg			
		<b>7 kg</b>	<b>30 kg</b>
<b>SPF beregnet</b>		214	363
<b>Økologisk smågris</b>			820
<b>Nordjysk pulje konv.</b>		134	285
<b>SPF pulje konv.</b>		122	280
<b>SPF pulje -PRRS</b>		142	300
<b>Porcex pulje -PRRS</b>			290
	<b>Søer</b>	<b>Smågrise</b>	<b>Slagte-Svin</b>
<b>Foderpriser</b>	1,89	2,41	1,86
<b>Kr./FE</b>			
<b>DB/gris</b>		87	56
<b>0-pkt.</b>	255	428	12,41

### Spaltegulve

Fra 2013 må spalteåbningen ikke være over 14 mm for fravænnede grise og 18 mm for slagtesvin. Bjælkebredden skal mindst være 50 mm for fravænnede grise og 80 mm for slagtesvin.

Den 1. juli 2015 bliver det forbudt at have fuldspaltegulve. Minimum halvdelen af arealkravet til smågrise skal bestå af fast eller drænet gulv, og for slagtesvin er det 1/3. Åbningsarealet i drænet gulv må maksimalt været 10 %, og de traditionelle spaltegulve typisk er 18-20 %.

Man skal da have ændret dele af gulvet til drænet gulv ved at udskifte elementer og lægge drængulvs-elementer i en del af stiaarealet, eller man skal lukke en del af spalteåbningerne med tilpasningsstykker, som kan købes.

Alternativt kan man overstøbe dele af stiaarealet eller udlægge måtter eller plader i en del af stiaarealet. Sidstnævnte løsning vil grisene dog hurtigt kunne gnave i stykker, hvis ikke det er tilstrækkeligt fastgjort ved hjælp af skinner, eller hvis måtten består af blødt materiale. Der vil også blive øget risiko for svineri i stien.

### Fodermarkedet

Der er godt gang i byttehandlerne og vi ser nogen fornuftige byttepriser. Der skal dog arbejdes på sagen, og kun ganske få landmænd har været så konsekvente i deres afvisning af "krejl" i de foregående år, at fodersælgerne ved, at de kun får en chance når der gives bud. Det har betydet, at der i mange handler har været tale om lange forløb med mange priser. Man skal holde godt øje med hvilke fradrag der kommer på for levering af korn og foder.

Samlet set er der ikke tegn på stigende råvarepriser, selv om kornet er steget siden det var billigst omkring 1. juli. Stigningen er meget lille, og forventningen til fald er større end forventningen om yderligere stigning.

Agromarkets melder at trenden på korn peger ned på lang og mellem-lang sigt. Det betyder, at man som ren foderkøber skal være varsom

med at købe lange kontrakter. Vi ser dog også, at de som køber til dagspris kan få en kontrakt på 1-2 måneder til lavere pris end dagsprisen. Man skal derfor overveje om værdien af en fast kontrakt på 1-2 mdr. sigt ikke er bedre end dagspriser, da man også sparer en del tid.

### **Navlebrok**

Det bliver ofte diskuteret om ikke man kan løse problemet med navlebrok gennem avlen. Det er dog tvivlsomt om det kan betale sig, blandt andet fordi miljøet har langt større indflydelse på navlebrokken end genetikken, fortæller Birgitte Ask, som er seniorprojektleder i Genetisk Forskning og udvikling, VSP.

### **Hvis man via avlen skulle selekttere imod navlebrok vil det bl.a. være nødvendigt at**

1. Registrere navlebrok i produktionsbesætninger
2. tildele meget stor økonomisk værdi i avlsmålet.

Problemet ved (1) er, at det vil være særdeles svært at få troværdige og korrekte registreringer samt at produktionsdyrene er så fjerne slægtninge til avlsdyrene, at den ekstra information, der kan opnås om de genetisk forskelle imellem avlsdyrene, i høj grad udvandes. Konsekvensen af (2) vil være relativt store tab i økonomisk fremgang i de andre egenskaber i avlsmålet.

Det kan derfor ikke betale sig at implementere genetisk selektion imod navlebrok. Den nuværende strategi i Danavl er, at udelukke dyr der selv har navlebrok fra videre avl.

Kilde notat nr. 1124, VSP

### **Nyt korn syndromet**

Indtil det nyhøstede korn er lagerfast, det vil sige ca. 2 til 3 måneder frem, kan det anbefales at tilsætte ekstra E-vitamin til det hjemmeblandede foder. Årsagen er, at kornet under færdigmodningen på lageret forbruger E-vitamin, som derved forsvinder. For at kompensere for det manglende E-vitamin i kornet pga.

færdigmodningen, bør indholdet af E-vitamin i foderet øges. Det kan evt. gøres ved at tilsætte vitaminet manuelt tre gange om ugen. Doseringen bør være 50-100 mg E-vitamin pr. kg færdigfoder.

De fleste grovvarerfirmaer tilsætter ekstra E-vitamin til foderet indtil december for at imødegå nyt korn syndromet.

E-vitamin medvirker til at opretholde produktiviteten og et stærkt immunsystem. Mangel på E-vitamin kan hos søer give dårlige reproduktionsresultater samt flere svage og dødfødte pattegrise.

### **Hygiejne i foderladen**

Mange problemer i svinestaldene så som diarre og dødsfald ved smågrise samt flåd, kastninger og yverbetændelse ved søerne kan relateres til dårlig foderhygiejne.

I forbindelse med at der er udarbejdet en manual om god antibiotika-praksis er der udarbejdet et håndbogsblad med titlen "foderhygiejne i foderladen".

Håndbogsbladet beskriver hvad man kan gøre for en bedre foderhygiejne i udendørs siloer, møllen, tørfoderblander, vådfoderkar, færdigvaresiloer samt sneglerender, redlere og optagestationer.

Håndbogsbladet findes både på dansk, engelsk og russisk. Den danske udgave medsendt svineinfo i denne uge.