

### Noteringen

Svinenoteringen er for næste uge uændret.

Danish Crown og Tican	
Slagtesvin	10,20
Søer	6,70
Orner	5,70

Basisvægtintervallet ved TiCan er 70-89,9 kg og ved Danish Crown 70-87,9 kg.

Kødprocentgrundlaget ved Tican er justeret til 60,5 % og ved Danish Crown 61 %. Regulerings-satserne for kvalitet, mængde og indtransport er forskellige ved de 2 slagterier.

	7 kg	30 kg
SPF beregnet notering	246	395
Økologisk smågris		790
Nordjysk pulje konv.	219	360
SPF pulje konv.	225	370
SPF pulje -PRRS	238	380
Porcex pulje -PRRS		380

	Søer	Små-grise	Slagtesvin
Foder-priser	1,28	1,81	1,28
DB/gris		178	144

### Slagtevægt

Danish Crown gør opmærksom på at der leveres for mange små grise. Ved at lægge lidt ekstra kilo på grisen, kan man ofte hente en ekstra gevinst hvis ikke stalden absolut skal tømmes. Går man fra 81 til 84 kg tjenes 6 kr. mere pr. gris, og leverer man en gris på 78 kg kan tjenes 16 kr. mere på denne ved at bringe den op på 84 kg. Slagterierne har øget vægtgrænserne, så man ved Tican må levere dem op til 89,9 kg og ved

Danish Crown 87,9 kg uden overvægtsfradrag.

Når noteringen er høj skal man ofte stræbe efter en høj vægt på slagtesvinene for man har givet forholdsvis mange penge for den indkøbte smågris. Hvis noteringen ændres +/- 1 kr. ændres den optimale slagtevægt med +/- 1 kg.

### Vejning af svin

Hvis man stræber efter ikke at levere svin til slagteri der vejer under 77 kg, og man vejer eller vurderer svine 6 dage før levering, skal minimumsvægten være 94 kg levende vægt.

### Sovægt

Ønsker man at sammenligne en soafregning ved levende eksport med slagtevægt afregning i Danmark er den gamle regel at slagtevægt er lig levende vægt divideret med 1,28. En nyere beregning har vist at slagtevægt er lig  $0,7661 \times \text{levendevægt} + 1,611$ . Det giver typisk 2 kg mindre slagtevægt end den før nævnte.

### Kilde DC Update

### Halebid

Slagtesvin må ikke leveres med halebid. Opstår halebid i besætningen skal man straks gribe idet vi godt ved at grise kan være kannibaler.

### Forebyggelse

1. Undgå overbelægning
2. Let adgang til foder og rent drikkevand
3. Optimalt klima i stierne
4. Rodemateriale
5. Minimer sammenblanding.

## Akut behandling

1. Find den gris der bider hale og flyt den
2. Isolér de halebidte grise i en sygesti og afliv alvorlig angrebne
3. Tildel rigeligt med beskæftigelsesmateriale
4. Luk eventuelt låger op til enkelte stier, så grisene lettere kan undvige
5. Anvend overbrusning aktivt.

## Lugt og ammoniak

Ved at reducere råproteinindholdet fra 17,5 til 14,5 procent ved slagtesvin blev ammoniakudskillelsen reduceret med 26 procent. Ved at tilsætte 1 procent benzosyre til foderet blev ammoniakudskillelsen reduceret med 7,5 procent. 1 procent benzosyre i foderet koster 9 øre pr. FE svarende til 20 kr. pr. gris.

Foder med 14,5 procent råprotein opfyldte ikke normerne og vil medføre produktivitetssnedgang. Mindre protein i foderet havde ingen effekt på lugten.

## Cikorie

Et forsøg med smågrise viste at tilsætning af 7,5 procent cikorie og 0,5 procent benzosyre gav 50 gram mere tilvækst pr. dag ved smågrisene, og foderforbruget blev reduceret med 0,1 FEsv pr. kg. Tilsætning af cikorie og benzosyre gav desværre ikke færre lawsoniabakterier i gødning. Cikorie koster ca. 7 kr. pr. kg, men prisen skal ned på 3,50 kr. pr. kg for at det kan betale sig at bruge det.

## Driftsresultater 2009

I 2009 havde en gennemsnitlig svineproducent med søer og smågrise et negativt resultat på 750.000 kr. De 25 procent bedste havde et driftsresultat på + 300.000 kr. En gennemsnitlig slagtesvineproducent med 7.000 leverede slagtesvin havde et negativt driftsresultat på 500.000 kr., og de 25 procent bedste havde et resultat på + 400.000 kr. Svineproducenter med integreret produktion havde et negativt resultat på 800.000 kr. i 2009, men de bedste

25 procent havde et driftsresultat på + 500.000 kr.

Det er kendetegnende for de 25 procent bedste i regnskabsanalysen at de har lavere kapacitetsomkostninger og en lidt mindre produktion på disse ejendomme. De bedste bedrifter har også en lidt lavere gæld.

**Kilde VSP notat 1017**

## Åndenød

Du kan beskytte dig mod medicinalergi ved at have en forsvarlig omgang med antibiotika.

Vask hænder hvis der er risiko for at du har fået antibiotika på dem. Undgå direkte berøring med lægemidler.

Brug handsker når du er i risiko for at få antibiotika på hænderne. Lad være med at skyde overskydende antibiotika ud i luften når du trækker antibiotika op i sprøjten.

Brug åndedrætsværn med filter P2 eller P3 når du har risiko for at indånde antibiotika (f.eks. når du opblander antibiotika i foderet).

Sørg for at støve så lidt som muligt med antibiotika i pulverform.

## Benproblemer

Der skal være fokus på en god opvækst hos nye avlsdyr.

Langsom vækst, skridsikre gulve og lav belægning er nødvendig, og så skal vælges polte med en god benstilling.

Bliver en so dårlig gående på grund af ledskader skal hun have smertestillende behandling og opstaldes i sygesti.

## Aktiviteter

### Fodermøde

tirsdag den 8. juni 2010 kl. 19.00 på LandboNord – husk tilmelding